

## Primed 9 Brusnica 250g



PRIMED 9 Brusnica je prirodan preparat na bazi meda, brusnice i ljekovitog bilja. Ne sadrži vještak boje, konzervanse i druge aditive.

Ocjena: Neocjenjeno

Cijena

16,99 €

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Proizvođač: [Cortex Labs](#)

Opis

**PRIMED 9 BRUSNICA se preporučuje kod:**

- urinarnih infekcija, posebno E.coli infekcije
- gastritisa, posebno H. pylori infekcije
- bolesti ženskih genitalnih organa

**Sastav:** med, brusnica (*Vitis ideaefructus*), kantarion (*Hypericum perforatum*), hajdučka trava (*Achillea millefolium*).

**Kako deluje PRIMED 9 Brusnica?**

Aktivni sastojci preparata utiču na poboljšanje odbrambenih snaga organizma i pomažu u prevenciji neštih urinarnih infekcija. Redovnom upotrebo podstiču bržu eliminaciju bakterija i umanjuju mogućnost ponovnog javljanja infekcije.

Kombinacija antibakterijskog i zaštitnog dejstva na sluzokožu želuca, pomaže u prevenciji i tretmanu gastritisa bilo kog uzroka, a posebno gastritisa izazvanog bakterijom Helicobacter pylori.

PRIMED 9 Brusnica deluje blagotorno na zdravlje ženskih genitalnih organa, pa se redovna upotreba preparata preporučuje svim ženama, a posebno kod postojanja hormonskih poremećaja i infekcija.

#### **Kako se koristi PRIMED 9 Brusnica**

- Odrasli i djeca starija od 10 godina: Uzimati 1-2x dnevno po 1 kafenu kašičicu preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka. Polako otopiti u ustima, a zatim progutati. Preparat je najbolje upotrebljavati ujutru, na prazan želudac.
- Djeca od 3 do 10 godina: Uzimati 1-3x dnevno po pola kašičice preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka.

Za postizanje najboljih rezultata preporučuje se svakodnevna upotreba u trajanju od 3-6 meseci.

#### **Mere opreza i kontraindikacije**

PRIMED 9 Brusnica nije lijek niti zamjena za lijek i propisanu terapiju. Upotreba suplemenata ne može zamijeniti redovnu i raznovrsnu ishranu. Preparat ne treba da koriste osobe preosetljive na sastojke preparata i osobe sa insulin-zavisnim dijabetesom.

PRIMED 9 Brusnica preparat možete koristiti uporedno sa propisanom terapijom, odvojeno 2-3h od uzimanja drugih preparata i lijekova. U vezi sa upotreboom preparata u toku trudnoće i perioda dojenja, zatražiti mišljenje nadležnog ljekara. U toku primjene preporučenih dnevnih doza, prema priloženom uputstvu, nisu zabilježene neželjene reakcije i interakcije sa drugim preparatima i lijekovima.

#### **Bezbjednost**

Kontrolu zdravstvene ispravnosti preparata vrše akreditovane laboratorije u Republici Srbiji.

#### **?uvanje i rok upotrebe**

?uvati na temperaturi do 25°C, zašti?eno od vlage i direktnog sunčeve svjetlosti. Upotrebljivo do datuma odštampanog na ambalaži.

Posebno brinemo o vašoj informaciji o proizvodima na našoj web stranici. Međutim, kako se propisi o proizvodnji hrane?esto mijenjaju može doći do promjena u sastavu hrane, hraničnih materija ili alergena, prehranskih informacija itd. Uvijek trebate provjeriti etiketu na proizvodu, a ne da se oslanjate samo na informacije navedene na web stranici.

Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i lečenju. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelegode обратите se svom ljekaru, terapeutu, homeopatu.

\*Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.

#### **Recenzije**

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.