Primed 9 Brusnica 250g





PRIMED 9 Brusnica je prirodan preparat na bazi meda, brusnice i ljekovitog bilja. Ne sadrži vješta?ke boje, konzervanse i druge aditive.

Ocjena:Neocjenjeno
Cijena
16,99 €

16,99 €

Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod

Proizvo?a?:Cortex Labs

Opis

PRIMED 9 BRUSNICA se preporu?uje kod:

- urinarnih infekcija, posebno E.coli infekcije
- gastritisa, posebno H. pylori infekcije
- bolesti ženskih genitalnih organa

Sastav: med, brusnica (Vitis ideae fructus), kantarion (Hypericum perforatum), hajdu?ka trava (Achillea millefolium).

Kako deluje PRIMED 9 Brusnica?

Aktivni sastojci preparata uti?u na poboljšanje odbrambenih snaga organizma i pomažu u prevenciji ?estih urinarnih infekcija. Redovnom upotrebom podsti?u bržu eliminaciju bakterija i umanjuju mogu?nost ponovnog javljanja infekcije.

Kombinacija antibakterijskog i zaštitnog dejstva na sluzokožu želuca, pomaže u prevenciji i tretmanu gastritisa bilo kog uzroka, a posebno gastritisa izazvanog bakterijom Helicobacter pylori.

PRIMED 9 Brusnica deluje blagotvorno na zdravlje ženskih genitalnih organa, pa se redovna upotreba preparata preporu?uje svim ženama, a posebno kod postojanja hormonskih poreme?aja i infekcija.

Kako se koristi PRIMED 9 Brusnica

- Odrasli i djeca starija od 10 godina: Uzimati 1-2x dnevno po 1 kafenu kaši?icu preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka. Polako otopiti u ustima, a zatim progutati. Preparat je najbolje upotrebljavati ujutru, na prazan želudac.
- Djeca od 3 do 10 godina: Uzimati 1-3x dnevno po pola kaši?ice preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka.

Za postizanje najboljih rezultata preporu?uje se svakodnevna upotreba u trajanju od 3-6 meseci.

Mere opreza i kontraindikacije

PRIMED 9 Brusnica nije lijek niti zamjena za lijek i propisanu terapiju. Upotreba suplemenata ne može zamijeniti redovnu i raznovrsnu ishranu. Preparat ne treba da koriste osobe preosetljive na sastojke preparata i osobe sa insulin-zavisnim dijabetesom.

PRIMED 9 Brusnica preparat možete koristiti uporedo sa propisanom terapijom, odvojeno 2-3h od uzimanja drugih preparata i ljekova. U vezi sa upotrebom preparata u toku trudno?e i perioda dojenja, zatražiti mišljenje nadležnog ljekara. U toku primjene preporu?enih dnevnih doza, prema priloženom uputstvu, nisu zabilježene neželjene reakcije i interakcije sa drugim preparatima i ljekovima.

Bezbjednost

Kontrolu zdravstvene ispravnosti preparata vrše akreditovane laboratorije u Republici Srbiji.

?uvanje i rok upotrebe

?uvati na temperaturi do 25°C, zašti?eno od vlage i direktne sun?eve svjetlosti. Upotrebljivo do datuma odštampanog na ambalaži.

Posebno brinemo o ta?nosti informacija o proizvodima na našoj web stranici. Me?utim, kako se propisi o proizvodnji hrane ?esto mijenjaju može doc?i do promjena u sastavu hrane, hranljivih materija ili alergena, prehrambenih informacija itd. Uvijek trebate pro?itati etiketu na proizvodu, a ne da se oslanjate samo na informacije navedene na web stranici.

Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i lije?enju. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelagode obratite se svom ljekaru, terapeutu, homeopati.

**Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.*

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.